

Příbalová informace-RP

Informace pro použití, čtěte pozorně!

Název přípravku

GINKOR FORT

tvrdé tobolky

Držitel rozhodnutí o registraci

Ipsen Pharma, Boulogne Billancourt, Francie

Výrobce

Beaufour Ipsen Industrie, Dreux, France

Složení

1 tobolka obsahuje:

Léčivé látky:

Ginkgo bilobae extractum	14 mg
Troxerutinum	300 mg
Heptaminoli hydrochloridum	300 mg

Pomocné látky:

Stearan hořečnatý, srážený oxid křemičitý

Indikační skupina

Venofarmakum

Charakteristika

Přípravek má ochranný účinek na cévy. Zvyšuje žilní tonus, zlepšuje funkci kapilár, snižuje jejich propustnost.

Tento účinek je doprovázen místním snížením látek navozujících bolest, a dále snížením enzymů a volných radikálů, způsobujících zánětlivé procesy a poškození kolagenních vláken.

Přípravek dále podporuje krevní oběh zvýšením žilního návratu do srdce.

Indikace

Tento lék se používá u dospělých

- při léčbě příznaků venolymfatické nedostatečnosti (např. pocit těžkých nohou, bolest, primodekubit, „neklid“ nohou, varikózní žíly, a další). (Venolymfatická nedostatečnost = nedostatečná cirkulace v žilách a mízních cévách)

- při léčbě funkčních příznaků spojených s akutním hemoroidálním záchvatem

Kontraindikace

Přípravek se nesmí užívat při hypertyreoidismu (=zvýšení funkce štítné žlázy) a v kombinaci s antidepresivními léky typu inhibitoru monoaminoxidázy (IMAO).

Nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky přípravku nejsou známy. Při případném výskytu jakýchkoli neobvyklých reakcí se poraďte s lékařem."

Interakce

Aby se předešlo možným interakcím mezi léky, informujte vašeho lékaře o veškerých současně užívaných lécích, zvláště v případě užívání antidepresív typu inhibitoru monoaminoxidázy (IMAO).

Dávkování a způsob použití:

Pokud lékař neurčí jinak, podává se obvykle

- při venolymfatické nedostatečnosti (=při poruchách žilní a lymfatické cirkulace):
2 kapsle denně orálně, jedna ráno a jedna večer

- při akutním hemoroidálním záchvatu: 3 až 4 kapsle denně orálně při jídle po dobu 7 dnů.

Neustoupí-li příznaky do 7 dnů, poraďte se s lékařem.

Upozornění

Upozornění pro sportovce: tento přípravek obsahuje heptaminol, jež způsobuje pozitivitu dopingových testů.

V případě těhotenství nebo kojení se o užívání poraďte s lékařem.

Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se ihned poraďte s lékařem.

Varování

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Uchovávejte mimo dosah a dosah dětí.

Balení

30 tobolek.

Datum poslední revize

17.7.2009