

## **B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE**

## **PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE**

### **INCRELEX 10 mg/ml injekční roztok** mecaserminum

**Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.**

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám nebo Vašemu dítěti. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy..
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to lékaři nebo lékárníkovi.

**V příbalové informaci naleznete:**

1. Co je INCRELEX a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete INCRELEX používat
3. Jak se INCRELEX používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak INCRELEX uchovávat
6. Další informace

#### **1. CO JE INCRELEX A K ČEMU SE POUŽÍVÁ**

- INCRELEX je kapalina obsahující růstový faktor-1 podobný lidskému inzulinu (IGF-1), který je podobný IGF-1 produkovanému v lidském těle.
- INCRELEX se používá k léčbě dětí nebo dospívajících, kteří jsou na svůj věk velmi malí, protože jejich tělo nedokáže vyrobit dostatek IGF-1. Tento stav se nazývá primární deficiencie IGF-1.

#### **2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE INCRELEX POUŽÍVAT**

**Nepoužívejte INCRELEX**

- jestliže je pacient alergický (přecitlivělý) na mecasemin nebo na kteroukoli další složku přípravku INCRELEX;
- jestliže má pacient rakovinu;
- přípravek se nesmí aplikovat přímo do žíly.
- Benzylalkohol se nesmí podávat nedonošeným ani donošeným novorozencům.

**Zvláštní opatření při použití přípravku INCRELEX je zapotřebí**

- jestliže má pacient křivou páteř (skoliózu). Vývoj skoliózy musí být monitorován;
- jestliže má pacient zvětšené mandle (tonsilární hypertrofii). Pak musí chodit na pravidelná vyšetření;
- jestliže má pacient příznaky zvýšeného tlaku v mozku (intrakraniální hypertenze), například bolesti hlavy se zvracením, je třeba vyhledat lékaře, který poradí, co dělat;
- jestliže má pacient mírnou nebo silnou alergickou reakci na přípravek INCRELEX. Vyhleďte co nejrychleji lékaře, pokud má pacient vyrážku nebo kopřivku. Okamžitou lékařskou pomoc vyhleďte, pokud má pacient ztížené dýchání nebo příznaky šoku;
- jestliže u pacienta došlo k ukončení tělesného růstu (růstové ploténky jsou uzavřeny);
- použití přípravku INCRELEX u dětí mladších 2 let nebylo studováno, a proto se nedoporučuje.

## **Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky**

Lékaře informujte, zejména jestliže pacient bere inzulin nebo jiné léky proti diabetu; u těchto léků možná bude nutno upravit dávkování.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které pacient užívá nebo užíval v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, bylinných lécích nebo vitamínových doplňcích.

## **Používání přípravku INCRELEX s jídlem a pitím**

INCRELEX se má podávat krátce před jídlem nebo po jídle, protože může způsobovat hypoglykemické stavy podobně jako inzulin, a tudíž může snižovat hladinu cukru v krvi.

Při vynechání jídla nebo svačiny se dávka nesmí podat. Dávka se nikdy nesmí zvyšovat jako náhrada za jednu nebo více vynechaných dávek.

## **Těhotenství a kojení**

Léčbu přípravkem INCRELEX je třeba přerušit, pokud pacientka otěhotní.

INCRELEX se nesmí podávat kojícím matkám.

## **Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů**

Studie hodnotící účinky přípravku INCRELEX na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny. Hypoglykémie však může zhoršit schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Pacienti se musí vyhýbat jakýmkoli rizikovým činnostem (tj. řízení apod.) 2-3 hodiny po aplikaci dávky, a to zejména na začátku léčby přípravkem INCRELEX, dokud nebude zjištěna příslušná dávka přípravku INCRELEX, při které nedochází k výskytu signifikantních nežádoucích událostí souvisejících s léčbou.

## **Důležité informace o některých složkách přípravku INCRELEX**

INCRELEX obsahuje 9 mg/ml benzylalkoholu jako konzervační látku.

Benzylalkohol může způsobit toxické reakce a alergické reakce u kojenců a dětí do tří let.

## **3. JAK SE INCRELEX POUŽÍVÁ**

INCRELEX vždy používejte přesně podle pokynů, které Vám sdělil lékař. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se s lékařem pacienta nebo s lékárníkem. Obvyklá dávka je 0,04 až 0,12 mg/kg hmotnosti pacienta podávaná dvakrát denně. Viz „Návod k použití“ na konci této příbalové informace.

INCRELEX aplikujte injekcí těsně pod kůži pacienta krátce po jídle nebo svačině. Pokud z nějakého důvodu pacient nemůže jíst, dávku přípravku INCRELEX nepodávejte. Nezdvoujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

INCRELEX aplikujte injekcí těsně pod kůži pacienta na paži, stehně, břicho nebo hýždích. Přípravek se nikdy nesmí aplikovat přímo do žíly ani do svalu. Při každé injekci změňte místo vpichu.

Přípravek INCRELEX používejte pouze tehdy, je-li čirý a bezbarvý.

Léčba přípravkem INCRELEX je dlouhodobá. Další informace žádejte u lékaře.

### **Jestliže jste použil/a více přípravku INCRELEX, než jste měl/a**

Pokud jste injekčně aplikoval/a více přípravku INCRELEX, než jste měl/a, sdělte to prosím lékaři.

Akutní předávkování může způsobit hypoglykémii (nízký krevní cukr). Při dlouhodobém předávkování může dojít ke zvětšení některých částí těla (např. rukou, chodidel, částí obličeje) nebo k nadměrnému růstu celého těla.

Léčba akutního předávkování přípravkem INCRELEX má být zaměřena na odstranění hypoglykémie. Mají se konzumovat tekutiny nebo potraviny obsahující cukr. Pokud pacient není při vědomí nebo není dostatečně bdělý, aby mohl vypít tekutinu obsahující cukr, může být k odstranění nízké hladiny krevního cukru zapotřebí aplikovat nitrosvalovou injekci glukagonu. Váš lékař nebo zdravotní sestra Vám ukáže, jak se podává injekce glukagonu.

### **Jestliže jste zapomněl/a použít INCRELEX**

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.

### **Jestliže jste přestal/a používat INCRELEX**

Předčasné ukončení léčby přípravkem INCRELEX může zhoršit úspěšnost růstové terapie. Před ukončením léčby se prosím poraďte s lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

## **4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY**

Podobně jako všechny léky, může mít i INCRELEX nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to lékaři nebo lékárníkovi.

Níže jsou uvedeny nežádoucí účinky, které se vyskytly v klinických zkouškách s četností velmi časté (pravděpodobnost výskytu u více než 1 pacienta z 10).

#### Hypoglykémie (nízký krevní cukr):

INCRELEX, podobně jako inzulín, může snižovat hladinu krevního cukru. Znamky nízkého krevního cukru jsou: závrať, únava, neklid, hlad, podráždění, obtížné soustředění, pocení, nevolnost a rychlý nebo nepravidelný puls.

Při závažné hypoglykémii může dojít k bezvědomí, křečím nebo smrti. Pokud Vy nebo Vaše dítě používáte INCRELEX, musíte vyloučit účast na vysoce rizikových činnostech (jako je namáhavá tělesná činnost) 2 až 3 hodiny po aplikaci injekce přípravku INCRELEX, a to zejména na začátku léčby přípravkem INCRELEX.

Před zahájením léčby přípravkem INCRELEX Vám lékař nebo zdravotní sestra vysvětlí, jak se léčí hypoglykémie. Vy (Vaše dítě) musíte mít neustále k dispozici zdroj cukru, jako je pomerančový džus, glukózové želé, bonbón nebo mléko, pro případ, že se objeví příznaky hypoglykémie. Při závažné hypoglykémii, když Vy (či Vaše dítě) nereagujete a nemůžete vypít tekutinu obsahující cukr, je nutno podat injekci glukagonu. Lékař nebo zdravotní sestra Vám ukáže, jak se injekce aplikuje. Glukagon po injekční aplikaci zvyšuje hladinu krevního cukru. Je důležité, abyste Vy (či Vaše dítě) měli dobře vyváženou stravu obsahující kromě potravin obsahujících cukr také bílkoviny a tuk (např. maso a sýry).

Při léčbě přípravkem INCRELEX byla také pozorována zvýšená hladina krevního cukru.

#### Reakce v místě injekce:

Injekce přípravku INCRELEX může způsobit místní lipoatrofii (ztrátu tukové tkáně), lipohypertrofii (zvětšení tukové tkáně) nebo bolestivost, zčervenání či podlitiny v místě vpichu injekce. Reakce v místě vpichu lze eliminovat měněním místa aplikace injekce při každé aplikaci.

#### Zvětšené mandle:

Přípravek INCRELEX může Vám nebo Vašemu dítěti způsobit zvětšení mandlí. Některé příznaky zvětšených mandlí jsou například: chrápání, obtížné dýchání nebo polykání, spánkové apnoe (stav, kdy se ve spánku nakrátko zastaví dech) nebo tekutina ve středním uchu a také infekce ucha. Spánkové apnoe mohou způsobovat nepřiměřenou denní ospalost. Pokud tyto příznaky Vám nebo Vašemu dítěti vadí, vyhledejte lékaře. Byla také pozorována infekce mandlí. Lékař by Vám nebo Vašemu dítěti měl pravidelně vyšetřovat mandle. V souvislosti s léčbou přípravkem INCRELEX byly pozorovány otoky uvnitř nosu a zvětšený thymus a lymfatické uzliny.

#### Zhoršení sluchu

Má-li pacient potíže se sluchem, informujte lékaře.

Níže jsou uvedeny nežádoucí účinky, které se vyskytly v klinických zkouškách s četností časté (pravděpodobnost výskytu u méně než 1 pacienta z 10).

#### Anomálie srdce:

U některých pacientů léčených přípravkem INCRELEX ultrazvukové vyšetření srdce (echokardiogram) ukázalo zvětšení srdečního svalu. Váš lékař může před léčbou přípravkem INCRELEX, během ní a po ní provést echokardiografické vyšetření.

V souvislosti s léčbou přípravkem INCRELEX byla hlášena tachykardie a abnormality srdeční chlopně.

#### Intrakraniální hypertenze (zvýšený tlak v mozku):

INCRELEX, podobně jako růstový hormon, může někdy způsobit dočasné zvýšení tlaku v mozku. Mezi příznaky intrakraniální hypertenze může patřit bolest hlavy a nevolnost se zvracením. Má-li pacient bolesti hlavy a nevolnost se zvracením, informujte lékaře. Lékař může provést vyšetření a zjistit, zda se jedná o intrakraniální hypertenzi. Je-li tomu tak, může lékař rozhodnout o dočasném nebo trvalém přerušení léčby přípravkem INCRELEX. Podávání přípravku INCRELEX může po odeznění epizody pokračovat.

Byly též hlášeny poruchy vidění.

#### Sklouznutí hlavice femorální epifýzy:

Jedná se o stav, kdy vyklouzne horní část stehenní kosti (femuru). Pokud pacient začne kulhat nebo se u něj objeví bolest kyčle nebo kolena, je třeba okamžitě vyhledat lékařskou pomoc. Tento nežádoucí účinek je častý.

#### Zhoršení skoliózy (způsobené rychlým růstem):

Má-li pacient skoliózu, musí se u něj často kontrolovat, zda se nezhoršuje zakřivení páteře. Tento nežádoucí účinek je častý. Při léčbě přípravkem INCRELEX byly pozorovány bolesti a ztuhnutí svalů nebo kloubů a také malformace čelisti.

#### Infekce:

U dětí léčených přípravkem INCRELEX byly také pozorovány infekce v ústech, krku a horních dýchacích cestách. Tyto infekce mohou být doprovázeny horečkou.

#### Poruchy ledvin:

Byl hlášen výskyt ledvinových kaménků a s ním související bolesti a otoky ledvin.

#### Reprodukční systém:

Bylo pozorováno zvětšení prsů a ovariální cysty.

#### Zaživací systém:

V souvislosti s léčbou přípravkem INCRELEX se vyskytly bolesti žaludku, obtížné polykání, zvedání žaludku a zvracení. Byl také hlášen přírůstek na váze, zvýšená lipémie a zvýšené hodnoty jaterních enzymů.

#### Změny kůže a vlasů:

V souvislosti s léčbou přípravkem INCRELEX bylo pozorováno ztlustění kůže, znaménka, fibroepiteliální polypy a abnormální struktura vlasů.

K dalším hlášeným nežádoucím účinkům patřila ztráta energie, deprese, nervozita, dezorientace, nepříjemné pocity na hrudníku, závratě, třes a syndrom neklidných nohou.

## **5. JAK INCRELEX UCHOVÁVAT**

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

INCRELEX nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na štítku vedle značky EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C). Chraňte před mrazem.

Injekční lahvičku uchovávejte v krabičce, aby byla chráněna před světlem.

Po prvním použití lze injekční lahvičku uchovávat maximálně 30 dnů při 2 až 8 °C.

Léčivé přípravky se nesmějí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

## **6. DALŠÍ INFORMACE**

### **Co INCRELEX obsahuje**

- Léčivou látkou je mecaserminum. Jeden ml obsahuje mecaserminum 10 mg. Jedna injekční lahvička obsahuje mecaserminum 40 mg.
- Pomocnými látkami jsou benzylalkohol, chlorid sodný, polysorbát 20, kyselina octová 98%, octan sodný a voda na injekci.

### **Jak INCRELEX vypadá a co obsahuje toto balení**

INCRELEX je čirý a bezbarvý roztok k injekcím, dodávaný ve skleněné lahvičce uzavřené zátkou a těsnicím uzávěrem. Jedna injekční lahvička obsahuje 4 ml kapaliny.

INCRELEX se dodává v balení obsahujícím jednu skleněnou lahvičku.

### **Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce**

Držitel rozhodnutí o registraci  
Tercica Europe Limited,  
2 Harbourmaster Place,  
International Financial Services Centre,  
Dublin 1,  
Irsko

Výrobce:  
Fisher Clinical Services UK Limited  
Langhurstwood Road  
Horsham, West Sussex RH12 4QD  
Velká Británie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

**België/Belgique/Belgien,  
Luxembourg/Luxemburg**  
Ipsen NV S.A.  
Guldensporenpark 87  
B-9820 Merelbeke  
België /Belgique/Belgien  
Tél/Tel: + 32 - 9 -243 9600

**Italia**  
Ipsen SpA  
Via A. Figino, 16  
I-20156 Milano  
Tel: + 39 - 02 - 39 22 41

**България, România**  
Beaufour Ipsen International  
Aleea Alexandru, nr.10, Ap.2-4, Sct.3  
Bucuresti, 011823 - RO  
Tel: + 40 21(0) 231 27 20

**Latvija**  
Beaufour Ipsen International  
Bauskas 58  
Riga LV 1004  
Tel: +371 7622233

**Česká republika, Slovenská republika**  
Beaufour Ipsen International  
Střední 57/7 - 162 00  
CZ-Praha 6  
Česká republika/Ceška  
Tel: + 420 2 206 12 125

**Lietuva**  
Beaufour Ipsen International Kauno filialas  
Betygalos g. 2,  
LT-47183 Kaunas  
Tel. + 370 37 337854

**Danmark, Norge, Suomi/Finland, Sverige,  
Ísland**  
Ipsen Scandinavia A/S  
Park Allé 292  
DK-2605 Brøndby  
Danmark/Tanska/Danmörk  
Tlf: + 45 - 43 - 24 14 43

**Magyarország**  
Europharm Trade Kft.  
Hunyadvár utca 43/A  
H-1165 Budapest  
Tel.: + 36 - 1 - 402 42 04

**Deutschland, Österreich**  
Ipsen Pharma GmbH  
Einsteinstr. 30  
D-76275 Ettlingen  
Deutschland  
Tel: + 49 - 7243 184-80

**Nederland**  
Ipsen Farmaceutica B.V.  
Hoofdweg Oz, 620  
NL-2132 MJ Hoofddorp  
Tel: + 31 23 55 41 600

**Eesti**  
ESTOBIIN OÜ  
Udeselja 4-4  
Tallinn 11913  
Tel: +372 600 2996

**Polska**  
Ipsen Poland Sp z o.o.  
ul. Chłodna 29  
PL-00- 867 Warszawa  
Tel.: + 48 (0) 22 653 68 00

**Ελλάδα, Κύπρος, Malta**

Ipsen ΕΠΕ  
Αγ. Δημητρίου 63  
Άλιμος  
GR-17456 Αθήνα  
Ελλάδα/Greece  
Τηλ/Tel: + 30 - 210 - 984 3324

**España**

Ipsen Pharma S.A.  
Ctra Laureia Miro 395  
Sant Feliu de Llobregat  
E-08980 Barcelona  
Tel: + 34 - 936 - 858 100

**France**

Beaufour Ipsen Pharma S.A.S.  
24 rue Erlanger  
F-75781 Paris Cedex 16  
Tél: + 33 - 1 - 44 96 13 13

**Ireland**

Ipsen Pharmaceuticals Ltd.  
7 Upper Leeson Street  
IRL-Dublin 4  
Tel: + 353 - 1 - 668 1377

**Portugal**

Ipsen Portugal - Produtos Farmacêuticos S.A.  
Alameda Fernão Lopes, nº 16-11º, Miraflores  
P-1495 - 190 Algés  
Tel: + 351 - 21 - 412 3550

**Slovenija**

Pharmaswiss d.o.o  
Dolenjska cesta 242c  
SI-1000 Ljubljana  
Tel: + 386 1 236 47 00

**United Kingdom**

Ipsen Ltd.  
190 Bath Road  
Slough, Berkshire  
SL1 3XE  
Tel: + 44 - (0)1753 - 62 77 00

**Tato příbalová informace byla naposledy schválena**

Tento přípravek byl registrován za „výjimečných okolností“.

Znamená to, že vzhledem k vzácnosti onemocnění nebylo možné získat úplné informace o tomto léčivém přípravku.

Evropská léková agentura (EMA) každoročně vyhodnotí všechny nové informace týkající se tohoto přípravku a tato příbalová informace bude podle potřeby aktualizována.

Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Evropské lékové agentury (EMA): <http://www.emea.europa.eu/> Na těchto stránkách naleznete též odkazy na další webové stránky, týkající se vzácných onemocnění a jejich léčby.

<-----

## NÁVOD K POUŽITÍ

INCRELEX se má podávat pomocí sterilních stříkaček a injekčních jehel na jedno použití. Stříkačky musí mít vhodnou velikost tak, aby bylo možno předepsanou dávku natáhnout z injekční lahvičky s přiměřenou přesností.


### **Příprava dávky:**

1. Předtím, než přípravek INCRELEX začnete připravovat k injekci pacientovi, si umyjte ruce.
2. Pro každou dávku použijte novou jehlu a stříkačku na jedno použití. Stříkačky a jehly používejte pouze jednou. Správným způsobem je zlikvidujte. **Nikdy** nepoužívejte stříkačky ani jehly použité jinou osobou.
3. Zkontrolujte kapalinu, zda je čirá a bezbarvá. Přípravek nepoužívejte po datu použitelnosti ani pokud je zakalený nebo pokud jsou v něm viditelné částice. Pokud lahvička zmrzne, zlikvidujte ji.
4. Jestliže používáte novou lahvičku, sejměte ochranné víčko. Neodstraňujte gumovou zátku.
5. Gumovou zátku v lahvičce otřete tamponem namočeným v alkoholu, abyste zabránili kontaminaci lahvičky choroboplodnými zárodky, které se mohou zavléci při jejím opakovaném používání (viz Obrázek 1).




Obrázek 1: Otřete zátku alkoholem

6. Před zasunutím jehly do lahvičky vytáhněte píst a natáhněte do stříkačky vzduch odpovídající předepsané dávce léku. Propíchněte jehlou gumovou zátku lahvičky a zasunutím pístu vytlačte do lahvičky vzduch (viz Obrázek 2).



Obrázek 2:  
Vytlačte vzduch  
do stříkačky

7. Ponechte stříkačku v lahvičce a stříkačku i lahvičku obraťte dnem vzhůru. Stříkačku i lahvičku pevně držte (viz Obrázek 3).



Obrázek 3:  
Příprava k nasátí

8. Ujistěte se, že je hrot jehly ponořený v kapalině (viz Obrázek 4). Zatáhnutím za píst natáhněte do stříkačky správnou dávku (viz Obrázek 5).



Obrázek 4:  
Hrot v tekutině



Obrázek 5: Natáhněte  
správnou dávku

9. Před vytažením jehly z lahvičky zkontrolujte, zda ve stříkačce nejsou vzduchové bublinky. Jsou-li ve stříkačce vzduchové bublinky, podržte stříkačku s lahvičkou dnem vzhůru a poklepejte na stěnu stříkačky tak, aby bublinky vystoupaly nahoru. Bublinky vytlačte pomocí pístu a natáhněte správné množství kapaliny tak, abyste ve stříkačce měli správnou dávku (viz Obrázek 6).



Obrázek 6: Odstraňte bubliny  
a doplňte správnou dávku

10. Vytáhněte jehlu z lahvičky. Jehla se nesmí ničeho dotknout. Nyní jste připraveni k aplikaci injekce (viz Obrázek 7).



Obrázek 7:  
Připraveno k aplikaci

### **Injekce dávky:**

Injekci přípravku INCRELEX aplikujte podle pokynů lékaře.

Injekci nepodávejte, pokud je pacient nechopen přijmout jídlo krátce před injekcí nebo po ní.

1. Vyberte si místo aplikace injekce – na paži, stehně, hýždích nebo břichu (viz níže). Místo vpichu se musí při každé injekci měnit.



Horní část paže

Stehno

Hýždě

Břicho

2. Na místě, kde se má provést vpich injekce, očistěte pokožku pacienta alkoholem nebo mýdlem a vodou. Před injekcí musí být místo vpichu suché.

3. Pokožku lehce stiskněte. Zaveďte jehlu ve směru, který Vám ukázal lékař. Uvolněte pokožku (viz Obrázek A).



Obrázek A: Zlehka stiskněte kůži a aplikujte podle návodu

4. Pomalu stlačte píst stříkačky úplně dolů a ujistěte se, že jste aplikovali všechnu kapalinu. Vytáhněte jehlu přímo nahoru a místo vpichu jemně na několik sekund stlačte gázou nebo vatovým tamponem. **Místo vpichu netřete** (viz Obrázek B).



Přitiskněte gázu nebo tampon (netřete)

5. Při likvidaci jehly a stříkačky postupujte podle pokynů lékaře. Stříkačku neuzavírejte. Použitá jehla a stříkačka se musí odložit do speciálního kontejneru na ostrý odpad (např. do kontejneru na biologicky nebezpečný odpad), do obalu z tvrdého plastu (např. do lahve od čistícího prostředku) nebo do kovové nádoby (např. do prázdné plechovky od kávy). Tyto nádoby se musí uzavřít a správně zlikvidovat.